

Имунизационен календар на Р. България 2012

| Възраст | Вид имунизация | Вид ваксина | Поставяне |
|-----------------------|--|--|--------------------|
| До 24ч след раждане | Имунизация против хепатит тип В (I прием) | Рекомбинантна хепатит В ваксина | мускулно, 0.5 мл |
| От 48ч след раждането | Имунизация против туберкулоза | БЦЖ ваксина | вътрекожно, 0.1 мл |
| 1 месец | Имунизация против хепатит тип В (II прием) | Рекомбинантна хепатит В ваксина | мускулно, 0.5 мл |
| 2 месец | Имунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип В (I прием) | Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В | мускулно, 0.5 мл |
| | Имунизация против пневмококи (I прием) | Конюгирана пневмококова ваксина | мускулно, 0.5 мл |
| 3 месец | Имунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип В (II прием) | Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В | мускулно, 0.5 мл |
| | Имунизация против пневмококи (II прием) | Конюгирана пневмококова ваксина | мускулно, 0.5 мл |
| 4 месец | Имунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип В (III прием) | Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В | мускулно, 0.5 мл |
| | Имунизация против пневмококи (III прием) | Конюгирана пневмококова ваксина | мускулно, 0.5 мл |
| 6 месец | Имунизация против хепатит тип В (III прием) | Рекомбинантна хепатит В ваксина | мускулно, 0.5 мл |
| 7 месец | Проверка за белег от БЦЖ имунизация. На децата без белег се прави проба Манту (5 МЕ ППД) и отрицателните се реимунизират | БЦЖ ваксина | вътрекожно, 0.1 мл |

| | | | |
|---|--|--|-------------------------------|
| 12 месеца | Реимунизация против пневмококи, не по-рано от 6 месеца след третия прием (IV прием) | Конюгирана пневмококова ваксина | мускулно, 0.5 мл |
| 13 месеца | Имунизация против морбили, паротит и рубеола | Триваксина морбили, паротит и рубеола | подкожно или мускулно, 0.5 мл |
| 16 месеца, не по-рано от 1 година след третия прием | Реимунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип В (IV прием) | Комбинирана петкомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип В | мускулно, 0.5 мл |
| 6 години | Реимунизация против полиомиелит, дифтерия, тетанус и коклюш (V прием) | Комбинирана четрикомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента и инактивирана полиомиелитна ваксина | мускулно, 0.5 мл |
| 7 години | Реимунизация против туберкулоза (след отрицателна проба Манту) | БЦЖ ваксина | вътрекожно, 0.1 мл |
| 11 години | Реимунизация против туберкулоза (след отрицателна проба Манту) | БЦЖ ваксина | вътрекожно, 0.1 мл |
| 12 години | Реимунизация против морбили, паротит и рубеола | Триваксина морбили, паротит и рубеола | подкожно или мускулно, 0.5 мл |
| | Реимунизация против тетанус и дифтерия | ТД ваксина | мускулно, 0.5 мл |
| 17 години | Реимунизация против тетанус и дифтерия | ТД ваксина | мускулно, 0.5 мл |
| | Реимунизация против туберкулоза (след отрицателна проба Манту) | БЦЖ ваксина | вътрекожно, 0.1 мл |
| От 25-ата година, през 10 години | Реимунизация против тетанус и дифтерия | ТД ваксина | мускулно, 0.5 мл |